

# Hautdesinfektion mit Softasept® ISO 70 %

Als Sprechstundenbedarf abrechenbar



Schnell.  
Zuverlässig.  
Softasept® ISO 70 %.

- ✓ Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- ✓ Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- ✓ VAH-gelistet



# Softasept® ISO 70 %

Schneller Wirkungseintritt ab 15 Sekunden

## EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel
- Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- Farblos
- VAH-gelistet
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar

## INDIKATIONEN

Zur Hautdesinfektion vor

- Injektionen und Punktionen (z. B. Blutentnahmen, Impfungen)
- Operativen Eingriffen

ADK	LKK	BKK	IKK	VdAK	AEV	Knappschaft	UV*
Name, Vorname des Versicherten							
zuständige Abrechnungsstelle							
Kassen-Nr.							
Versicherten-Nr.							
Status							
Vertragsarzt-Nr.							
VK gültig bis							
Datum							
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)							
5 Stück Softasept ISO 70% 250 ml							
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7/1993)							

Die Abrechnung Ihres Sprechstundenbedarfs übernimmt gern Ihr Lieferant für Sprechstundenbedarf für Sie!

Kundenlogo einfügen  
(z. B. als \*.jpg, \*.png, \*.tiff, \*.gif)



Softasept® ISO 70 %	ART.-NR.	PZN	PREIS*/ST.
250 ml-Sprühflasche	19905	12372600	7,49 €
1000 ml-Flasche	19906	12372617	13,56 €
5 Liter-Kanister	19907	12372623	58,38 €

\* Unverbindl. Preisempfehlung, zzgl. Mwst.

## WIRKUNGSSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

<b>Bei talgdrüsenarmer Haut**</b>	<b>EZ</b>
vor Injektionen und Punktionen	mind. 15 Sek.
vor Gelenkpunktionen, Punktionen des Liquorraumes und vor Operationen	mind. 60 Sek.
<b>Bei talgdrüsenreicher Haut**</b>	<b>EZ</b>
vor allen Eingriffen	mind. 10 Min.

\*\* nach DGHM-/VAH-Richtlinien

**Softasept® ISO 70 %**  
**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enth.: *Wirkstoffe:* 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g.  
*Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser.  
**Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut.  
**Gegenanzeigen:** Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.  
**Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit Softasept ISO können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.  
**Warnhinweise:** Pfützenbildung unter dem Patienten vermeiden. Leicht entzündlich! Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen mit Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen von Zündquellen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten mit Wasser spülen.  
**Stand:** Mai 2016. B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.