

Hautdesinfektion mit Softasept®

Gut für die Haut. Gut für das Budget.



Schnell.
Zuverlässig.
Softasept®.

- ✓ Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- ✓ Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- ✓ VAH-gelistet

WIRKUNGSSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

Bei talgdrüsenarmer Haut*	EZ
vor Injektionen und Punktionen	mind. 15 Sek.
vor Gelenkpunktionen, Punktionen des Liquorraumes und vor Operationen	mind. 60 Sek.
Bei talgdrüsenreicher Haut*	EZ
vor allen Eingriffen mit Softasept® N	mind. 2,5 Min.
vor allen Eingriffen mit Softasept® ISO 70%	mind. 10 Min.

* nach DGHM-/VAH-Richtlinien



Softasept® N oder Softasept® ISO 70 %

Schnelle Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen

Softasept® N
Softasept® ISO 70 %



●	●	Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
●	●	Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
●		Langzeitwirkung bis zu 24 Stunden
●	●	Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze
●	●	Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
●		Wirksam gegen Rota- und Polioviren
●	●	VAH-gelistet
●	●	Als Sprechstundenbedarf abrechenbar*
●	●	Farblos
●		Gefärbt

* Regelungen einzelner Sprechstundenbedarfsvereinbarungen sind zu berücksichtigen.

Softasept® N ungefärbt	ART.-NR.	PREIS/ST.**
250 ml-Sprühflasche		
1000 ml-Flasche		
5 Liter-Kanister		
Softasept® N gefärbt	ART.-NR.	PREIS/ST.
250 ml-Sprühflasche		
1000 ml-Flasche		
5 Liter-Kanister		
Softasept® ISO 70 %	ART.-NR.	PREIS/ST.
250 ml-Sprühflasche		
1000 ml-Flasche		
5 Liter-Kanister		

** Unverbindl. Preisempfehlung, zzgl. MwSt. Lieferung, solange der Vorrat reicht

AOK	LKK	BKK	IKK	VdAK	AEV	Knappschaft	UV*
Name, Vorname des Versicherten							
zuständige Abrechnungsstelle							
Kassen-Nr.							
Versicherten-Nr.							
Status							
Vertragsarzt-Nr.							
VK gültig bis							
Datum							
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)							
5 Stück Softasept N ungefärbt 250 ml							
5 Stück Softasept ISO 70 % 250 ml							
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7/1993)							

Kundenlogo einfügen
(z. B. als *.jpg, *.png, *.tiff, *.gif)

Softasept® N/Softasept® N gefärbt

Zus.: 100 g Lösung enth.: **Wirkst.:** Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g. **Sonst. Bestand.:** Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzl. Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)). **Anw.:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen. **Gegenanz.:** Überempf. gg. Ethanol oder 2-Propanol od. einem der sonst. Bestand. Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten u. zur Anwendung in unmittel. Umgebung der Augen geeignet. **Warnhinw.:** Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. **Nebenw.:** Hautirritationen (Rötung, Brennen, insbesondere b. häufiger Anwendung). Kontaktallergien. **Stand:** 03/2015. B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

Softasept® ISO 70 %

Zus.: 100 g Lösung enth.: **Wirks.:** 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g. **Sonst. Bestand.:** Gereinigtes Wasser. **Anw.:** Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen u. Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen u. vor Punktionen v. Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. **Gegenanz.:** Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenw.:** Beim Einreiben der Haut mit Softasept ISO können Rötungen u. leichtes Brennen auftreten. **Warnhinw.:** Pfützenbildung unter dem Patienten vermeiden. Leicht-entzündlich! Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit u. Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen m. Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen v. Zündquellen. Bei Kontakt m. den Augen: Einige Minuten m. Wasser spülen. **Stand:** Mai 2016. B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.