

Hautdesinfektion mit Softasept® ISO 70 %

Als Sprechstundenbedarf abrechenbar



Schnell.
Zuverlässig.
Softasept® ISO 70 %.

- ✓ Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- ✓ Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- ✓ VAH-gelistet



Softasept® ISO 70 %

Schneller Wirkungseintritt ab 15 Sekunden

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel
- Kurze Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- Farblos
- VAH-gelistet
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar

INDIKATIONEN

Zur Hautdesinfektion vor

- Injektionen und Punktionen (z. B. Blutentnahmen, Impfungen)
- Operativen Eingriffen

ADK		LKK	BKK	IKK	VdAK	AEV	Knappschaft	UV*
Name, Vorname des Versicherten		zuständige Abrechnungsstelle		geb. am				
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status				
Vertragsarzt-Nr.		VK gültig bis		Datum				
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		5 Stück Softasept ISO 70 % 250 ml						
Unterschrift des Arztes		Muster 16 (7/1993)						



Softasept® ISO 70 %	ART.-NR.	PZN	PREIS*/ST.
250 ml-Sprühflasche	19905	12372600	7,49 €
1000 ml-Flasche	19906	12372617	13,56 €
5 Liter-Kanister	19907	12372623	58,38 €

* Unverbindl. Preisempfehlung, zzgl. MwSt.

WIRKUNGSSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

Bei talgdrüsenarmer Haut**	EZ
vor Injektionen und Punktionen	mind. 15 Sek.
vor Gelenkpunktionen, Punktionen des Liquorraumes und vor Operationen	mind. 60 Sek.
Bei talgdrüsenreicher Haut**	EZ
vor allen Eingriffen	mind. 10 Min.

** nach DGHM-/VAH-Richtlinien

Softasept® ISO 70 %

Zus.: 100 g Lösung enth.: **Wirks.:** 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g. **Sonst. Bestandt.:** Gereinigtes Wasser.
Anw.: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen u. Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen u. vor Punktionen v. Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. **Gegenanz.:** Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenw.:** Beim Einreiben der Haut mit Softasept ISO können Rötungen u. leichtes Brennen auftreten. **Warnhinw.:** Pfützenbildung unter dem Patienten vermeiden. Leicht entzündlich! Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit u. Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen m. Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen v. Zündquellen. Bei Kontakt m. den Augen: Einige Minuten m. Wasser spülen. **Stand:** Mai 2016. B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen.

Die Abrechnung Ihres Sprechstundenbedarfs übernimmt gern
Ihr Lieferant für Sprechstundenbedarf für Sie!